庫全書

子部

欲發搐 强手足拳發指者此名顧也其發指之病最為重大 火足口事亡皆 欽定四庫全書 有因漸亦有將發之候以明之也養小兒之家若 赤縣即不安悸惕上寬不發搖者此名驚也重者上視 兒覧間者世俗之總名須分輕重也輕者但身熟面 驚癇論上 免衞生總微論方卷四 小兒衛生鄉微論方

熱吐児喘養者欲發搖也 欲發搖候下項 摇頭美舌者欲發搖也 辨之求治於未發之前不惟易愈又不至於危殆今集 言手足搖動者欲發搖也 强常汗出者欲發搖也 潮熱或壯熱不歇者欲發搖也 播也 髮上逆啼面暗色不變者欲發搖也 目上 一視喜惕者欲發播也 手足喜振掉者欲發搖也 善大目直面青者欲發搖也 暗氣下而妄怒者欲發搖 **皇中婦大便小便不利者** 睡中時笑或狂語 身熱項

熱不乳數惕桃者欲發搖也 欠足四年亡 生涎欲發播也 青呵欠頓問者欲發搖也 欲發播也 視者欲發搖也 鼻口青喜忪悸者欲發搖也 涎威馬壅呀呷有聲者欲發搖也 日直色赤或青者欲發播也 面色青黃上寬氣急者欲發搖也 1 · 乳不和或噎乳唇舌 以者欲發搖 吐利不止厥痛時起者欲發搐也 小犯衛生總微論方 掌中赤印內青筋見怕物 體熱口中氣亦熟面目 咬牙甚者欲發搐 瞳子卒大異常 卧而不安身 眼

發搖之候世俗所說者多矣有言 証軟紫圓微下之成其威氣令終了 孫真人日小兒眠睡不稳或身熱之時見有諸小驚之 悶撮口吐舌者欲發搖也 視不精皆欲發搖也 發播 次甚佳方已在前 口頰題亦者手足心皆熱喜冷者欲發搖也 日人と言 卷四 身熱小便難或目直視或 一証屬一 小病癎發搐也月用 一嵐 目痴旨 証屬

一煩熱騰入 眼驚入 白面青 下白驚入膽氣喘吹水驚入肺面紅臉赤驚入心五 嘔吃水脾驚患脉微氣喘一同言漢東王氏言非時 東咬牙驚入野非時用眼病歸肝夜啼到曉元因肺唇 啼哭驚入三焦如此之 府喬岳歌曰小兒驚候有多般不顯根源見病難睡 1 八肝睡後咬牙驚入腎夜啼到曉驚入小腸面青 一牌中銀響驚入大腸乾嘔無時驚入胃睡 般看前後心煩四肢熟面紅如火何心間 . . . } 紀對生態数論 類言至百種叢胜無據何

分三種一 青脉朝眼第二次發山根青脉見第三次發眼下臉連 銀定匹庫全書 抵不發指者為驚發指者為潤也千金論潤証大體只 屈指如數乃發口中氣熱呵欠頓問手足 **耳後完骨上青脉如線者為癇此等之論亦為臆該大** 金匮青脉見又言發指面亦指內青紋見者為潤又云 為治又有言驚發三次為癇者第一次發两太陽左右 一日驚癇猛聞大聲或撲什驚怖而作其証先 日風痼因解脫衣袂觸冒風邪而作其証先 人摇動治當

ž

其象肝為大癎目直視身反折手拳大鳴心為馬癎張 喜味吐逆腹脹故小兒有癖積脉大者必發痼治當下 之便愈詳此三種雖諸病皆能變癇其不緣於風幣食 之此三種內風驚二癎時時有之食癎者十中無 安神去熱三日食癎因乳哺失節或有積碎而作其証 先不乳而吐先寒後熱乃發其証身體或温或熱多睡 所作也又內經有云五蔵主五畜其間發重者各見 乃發心神不寧不可下之下之內虚則病益威治當 ī ! 小闸衛主衛最滿方

則 胂 満牛叫肺為雞癇搖頭反折手縱搐揭雞叫皆為猪癇 |銀定四庫全書 兒諸病新外皆能變癎發搐者以人有病則飲食退 也然不若錢乙所論發搐者乃心肝二蔵為病也其理 目横身直如尸吐沫猪叫已上論癎發者乃諸書精要 有據而妙肝主風心主火風火相加發而為搖前論 摇頭肯强硬馬叶 胃不旺肝必凌之引動肝風肝 不能發搖又人有病則氣 瞪云 4, 血錯亂心神不寧引動心 吉 半哨牌為牛相目痴腹 又主掣若不得心火 减

播在日中已午末時者此心用事之時也心惕目上白 此肝旺也錢治補肾瀉肝是謂補其母而瀉其子也發 時也身體壯熟目上視手足搖動口生熟涎項頭强急 |旅雖不正主亦有相乗 無見之証及 所發亦有其時假 亦如風之蕩火焰熾掣然也故肝心二蔵為病之源餘 為子母俱有定熟風火相搏驚掣相持乃能發搖其狀 灰心圣 驚若不得肝風亦不得發播也須肝心二蔵 相 如錢論潮熱變發搖在早晨寅如辰時者此肝用事之

決足口華全書

小兒衛生總微論方

緊斜喉中有涎大便銀褐色乳食不消多昏不納津 心而補其脾發播者心肝寔為病之源故為之手足冷 者此好用事之時也不甚搖眠此不稳身體温壯目睛 甚搐而喘身熱腫露睛手足冷大便黄水錢治濕其肝 **播在日晚中酉戍時者此肺用事之時也目微斜視不** [寫心心熟退則肝母亦不能旺是謂子能令母虚也發 精亦色牙關緊急口內 涎生手足摇動此心旺也錢治 (便黃水者脾虚候也故補之發擔在夜間或子母時

岩更 大足四年 白馬 見寬則寫况發搖是心火旺所作而肺金寔証亦罕 蔵俱寔為病之源故也其肺臓有虚寔之証見虚則 津液皆脾衰之証故補其脾也已上四歲分主十二時 一時是腎虚心熱極甚也故但獨其心熱退則肝亦平矣 **河其心而不 溟其肝者此本因潮熱所作發在腎用之** 一錢治但寫其心而補其脾且心肝二歲為病之源今獨 一蔵為無見之証此潮熱發搖治則惟寫心肝者盖二 溟肝則 腎轉虚矣其大便銀褐色乳食不消不納 小兒衛生總微論方 補

将此三事参推五蔵審别形候察其虚臭 發搖真假及各於逐項之下以錢治法為証後學之士 法為治則小兒發搖之病無以外也 以錢論三事参之一者發搖逆順二者發搖陰陽三者 經有云虚則補其母寔則寫其子先補其母後寫其子 子能令母虚母能令子寔錢乙論此發搖元由為治次 搖者有之外腎嚴但主虚而無臭見其虚則補之內 乃謂得聖人之經肯深意也可謂出群拔萃矣今更 、観以時刻依

大指屈外或目左視有聲者逆也順者相勝也左肝為 右播或手大指屈內或目右視有聲者逆也女發右搖 逆極難更當参其發時以補濕為治昔錢乙治李寺 男發左搖或手大指屈外或目左視無聲者順也若發 發搖逆順 或手大指屈内或目右視無聲者順也若發左搖或手 右肺為金一負一勝故無聲也逆者戰也二藏俱穿 金相擊故有聲也順者易治逆者難治男逆稍易女 小兒衛生鄉微論方

欠己可戶 亡年日

能 為陽本發左視無聲則順右視有聲則逆所以然者左 子三歲發播 時尚不能勝肺是肺强而肝大弱也當補其肝腎 乃寫强補弱假令女發搖目左視是肺來勝肝肝 時日同西 木也右肺金也逆則二歲相戰金木相擊而有聲 任故叶哭也當寫其肺後治其心續治其肝若病在 正 肺無旺位當大寫其肺 若男發搖目右視是肝來勝肺而叫哭當寫 自如至已目右視大叶哭し見日逆也男 若病在春甲晨此

火足四事全書 子三歲每日西發搖身微熱自微斜露睛四肢分而喘 病退也後補其腎續治其肝心五日而愈し又治徐 病男反女故稍易治於女也先寫其肺不問亂以 凡搖則是風熱相搏於內風属肝故引見於目也 也當補其肺大濕其肝所以言目反視者乃肝主目 、便微黄請し與李 秋日明此肺旺之時尚不能勝肝是肝强而肺極 心若病在春夏早景日肝心旺時當大鴻其肝若病 Ų |醫同治乙問李日病播 小兒衛生總微論方 知 肺

發搖 母亦弱木氣垂之四肢即 西 /然後治其心肝九日乃愈此亦逆 肺用事之時肺主身温今且熟者肺虚也 樂治之李對不當己曰搖者心肝臭也身微熱者 必當右視也今舉 陰陽 肺相乗勝也四肢冷者脾虚也肺若虚甚則 急慢驚者古書無有惟曰陰 附附 陰陽 血以明逆 牆擋 冷治當先補脾 順為治之法爾 搐 肝肺相勝 日微斜 胂 虚証 目 胛 日

熟不可與巴豆飲樂大下之恐畜虚熱不消小兒疾壅 視連割手足搖急牙關緊以項情强直延朝響此因 積熱於心因聞大聲或誤驚觸則動而發搖若熱極者 及其發定則了然如故此陽威陰虚治當利驚以除風 熟極則生風風屬肝心肝子母風火搏熾動而發搐 陽指者身大熱面赤引飲口中氣熱大小便赤黃眼上 以陰静而緩故陰搖曰慢驚此陰陽驚癎發搖之別也 急慢驚者乃後世名之也以陽動而速故陽搖曰急驚 · 11.2 7.1. 小兒別生戀數論方

國京四年全 天中 陽搖之候也治宜去涎熱昔錢乙治麻親宅七太尉 食为無度致煩毒之氣流入於乳因以乳兒令兒宿滞 附 雖不因間聲驚觸亦自發搖小兒本寔者多此候 甲皆青狀若神崇俗謂之天吊此非天能吊人 不消熱毒乗心發為驚搐眼目翻騰壯熱不休甚者爪 八使發陽擋自寅至午於未發前錢乙見其目直視 上視故取意名之况小兒發搖未有不眼上者寔 小兒心馬壅滞涎感熱積不得宣通或因母飲酒 建 7 以其眼 亦

當補其脾胃鴻去肝風小兒虚弱雖不因吐鴻取轉直 昏似睡而無精神眼露睛微微上視或胃痛而啼作鴉 鴻過甚致脾胃虚損而生風在苒乃成此陰威陽虚治 聲或不能啼哭唇口白色脉沉弱此因大病之後或吐 也陰搖者身温面說白手足似搖不搐但時時瘦凝昏 時治乃濕其心肝而補其腎病遂得愈此亦濕强補弱 **索肥而本寔其脉急促發搐自寅至午皆心肝用事之** 顋赤此心肝俱熱更坐石机子就冷此熱甚也又肌體 . .). 兒衛生懲殺論方 +

已本謂 能解 矣臭 冷或病吐瀉醫以温樂補之不已復用凉樂治之 發陰搖者亦有之本怯者多此候 風 証者皆因脾胃虚怯而生風 | | | | | | | | 口具中氣皆冷小兒亦 風 至十餘日其証昏睡露睛大便 月 明傷於風 在 陰播 全建 胃 冷醫亂治之致脾 ż 間故大 當去 養四 有 便不聚而寫時寒凝身體 田衛 所為也故俗謂慢 也 虚而内 **所傳或諸病** 風退 不聚而寫 附胛 利止 -], 不能散 因 北 人變 傷 又不 胛 胛 見 風 四

氣夏而難衰之復補脾胃則微能飲食所以然者謂 利大小便使脾肾俱虚當閉目身冷即死今此兒幸 利之必身冷王曰已身冷矣己曰不能食而胃中虚若 醫以樂利之而復身冷尚欲令乙利小便乙曰不當利 樂以定胛胃即開目身温王疑其子不大小便又令他 胃告錢乙治王氏子病吐鴻他醫以樂下之至虚變 **搐其候睡露睛手足瘈癡而身冷乙見曰此慢驚也** 小便脾胃虚寒當補脾而不可別攻也後不語他醫 姐 胎

欠己り事

在上

小兒衛生網微論方

發搖真假 莫不隨母母調適平宜喜怒失常或聞大聲或有擊觸 作失音治己曰既失音何開目而能飲食又牙不噤 半月能言一 俱虚令脾已臭腎尚虚故也遂以樂補腎及依法為治 口不緊他醫不能晚乙曰此因用清藥利小便致脾腎 真者兒在母胎中時血氣未全精神未倫 4 月而痊 ,胎感於內至生下百日以來 固有所 則動静喘息 而

候重者亦不呵欠嚏噴與胎癇相似然發頻者輕輕則 則兒不能任故發搐搦口中氣熱呵欠嚏噴此風痼 以來肌膚嫩怯血氣軟弱被外風傷之入客於內每遇 稀而難治不過三两次必死矣假者兒生出母腹百 火足口事 产 易歇故也治當發散昔錢乙治李司戶孫生百日來發 或酒青黄水是胎癎也是內蔵感病發為直播然亦 引動其疾則身熱吐哏心神不寧睡即昏騰躁啼無時 面青腰直手足搐搦口撮顋縮目瞪氣冷或眼閉膠 小兒衛生總微論方 日

驚癇雜論 傷之兒不能任故發搖也然頻發者輕以客風在內每 已無用封無不效已上錢乙所用方並本集載之 遇不任即搖輕則易歇故發頻也搖稀者是內蔵發病 揺 仍不可多服盖兒至小易為虚冥多即生熱止 不可救也乙用微劑以散風邪兼塗顋浴法治之乃愈 癇治皆無應後請し治し曰嬰兒初生肌骨嫩怯被 日三五次請銀醫治或作熟天甲或作胎驚或作驚 して 卷四 服 而 風

販完四車全書 定用樂下其疾熱如射者圓軟金丹桃枝圓之類如 切當救乃危候也方搖之時但與扶持慎勿擒捉盖風 則心神安寧即愈 氣方威恐流入筋脉致手足曲戾不隨或成拘攣 小兒急驚問孝忠云當其搖勢威時與鎮心治熱樂 ,服如射香圓抱龍圓辰砂圓點雪之類候驚勢 紀急驚雖搖甚不用忙擾亦不足畏慢驚雖微搖 兒慢驚若因吐濕已成虚損者問孝忠云當與速 N 小兒衛生總微論方

意減金液丹加白圓子無用異攻散羌活膏鉤藤飲之 生胃氣以理中并研金液丹末煎生姜米粥調灌之多 樂慢驚合用温樂世人多用 調理頻頻與粥雖至危者往往死中得生 乃效候胃氣生手足漸煖四支猶然與凝即減金液 紀急慢驚陰陽異証切宜辨而治之急驚合用京 不知樂性自有温凉豈可泛用初虞世謂治陰陽 分增青州白圓子一二分同研如上 樂不能分別誤小兒多 服漸漸以

飲定四年全書 副之 者為產又名乃中風之候為在 少用之惟凉故也 言慢驚樂中宜去龍腦縱須合用必以温樂為佐或 **獨寒温樂性當於方中** 小兒發指時醒而身軟者為獨若發播下 恐猛開大聲而發搐 兒於天陰雷發聲之時必拖塞其耳或作雜聲以 兒婚癇洩寫等諸病煩渴者皆津液內耗也 P 小兒衛生總微詞方 用時增損則無失矣又問孝 中 不時醒身硬 H

方為治者則各用所主樂相無治之 與驚癇相無可以一 **所集之方多不用銀粉如須用之者當依此酌量減損** 陰陽煎錢氏白木散使任意取足飲彌多彌好 小兒驚癇藥中能不用水銀輕粉者尤佳如不得 小兒欲生瘡疹有發搖者當從瘡疹為治餘諸病有 用之僅去其疾即止盖小兒腸胃易損亦傷口齒 兒驚蜣娘為治第 方為治者依法用之若不可以 世醫多不學未見有用者 全

水化下 變成癎者以神題為末入腦射各少許温水調服若已 ス・ファ·? 砂同末服之若變癎滑利者以麹末蜜圓如雞頭大 成潤哭如楊聲面色青黃手足爽凝咽中不利更 ·兒吐寫後精神困頓多睡不吃乳食四肢逆冷欲 樂 两琥珀甘草各二钱硃砂雄黄各 小兒衛生總微論方 不堪用去其頭趄足多 土丘

同士 |劉定匹庫全書 水塞圓如雞頭大名太 論方卷四 包四 一丹治小兒百病

欽定四庫

子部 小兒衛生總微論方卷五

校對官中書 總校官進士且緣 勝銀監生 臣王 臣李斯咏

琪

編修臣倉聖脈覆勘

詳校官太醫院恩程·表天動

試

钦定四軍 全書 右同和如稀 石諸熟改心神截 篇順欲發 14 水浸一宿 小兒衛生鄉微說方 10000 慢火放取汁 竹憑法 得两石臼中科 一种那十黄 一旋合

一琥珀丹治如前 右拌匀煉蜜圓如雞頭子大每服 量大小增減用無時 湯化下量大小增減用無時 一百下成青圓雞頭子大每服 龍腦 琥珀 天麻 研 两 鋑 白附子两香白芷牛 研白殭難女半 两臘月牛 一九前人 御日 未硃砂小 圓煎人参薄 膽製天南星 飛雨 研 婀-

鉤藤飲子治發熱時時戴眼口吐涎沫欲發癇搖 生葛飲子治熱極不已欲發驚癇 7.7 量大小與服得微汗為妙乳母思恭類炙煩之物 再慢煎敷沸下牛黄 右麓末每服 右相和每服半合量大小與之無時 鉤藤平虾蟬上做地人参上着黄芩一大黄 生萬汁的竹憑合牛黄如杏仁 大錢水一盏煎至六分入竹憑半合 小兒許生您段論方 小豆許細研入之攪匀放温

宜先與此服之 治小兒心胸積熟毛焦睡中狂語欲發驚 多定四年全書 二合少少頻與兒大以意加之無時 参苓散治小兒忽作驚状目上視手足强未可服驚樂 右同研如粉每服一 無時 ·免熟威夜後狂語欲發驚以竹瀝一歲兒連夜飲 砂米两研牛黄六 錢摩犀角水調服量大小

又治方如前 アン・ジー・し シュー 茯神散治小兒煩熱心悸手足搖動欲發 驚癇 半合更煎一两沸量大小與服無時 右為簏末每服一錢水一盏煎至五分去滓入竹 右為末每服 茯神去心龍齒細牛黄砌犀角屑各半寒水石 石膏研飛川大黄纸 参盖茯苓去黑皮甘草一分 錢温湯調下食空服 小兒衛生想殺論方 -啊-

一銀定四庫全書 辰砂金箔散治小兒心馬邪熱神志不寧悸惕煩渴聽 合更煎 右為末每服 不稳美古齧齒疾臭效逆咽嗌不利欲發驚癎 青州麥門冬去 辰砂叶錢桔梗五錢人参去錢白茯苓去沒蛤 茯神去心龍齒 研升麻 二沸量大小與服無時 一錢水一 半矣腦子字金箔片 一盏煎至五分去浑入竹瀝半 甘草菜為寒水石 石

にとり 声という 牛黄散清心凉見截驚癎欲發已發 掺病废嚥津必效 右同拌研匀每用一字新汲水調下無時 **塗舌上令自嚥百日上兒或大便游者蜜湯調** 與服一歲上者半錢咽喉腫痛口舌生瘡者以上 右為細末百日已下兒用半字至一字薄荷水調膏 货 牛黄細師林砂水縣的猪門所蝎稍十分天竺 り動様し 分 小兒衛生總微點方 許

急風青利胸馬清心神截欲發已發整痼 雌黃圓治眼直惡聲嚼舌吐沫欲發驚癇 右同研細用牛乳半升熬成膏和劑圓蒙真大每服 5四月全量 三圓温水下日三如無牛乳用羊乳亦得 雌黄小两研黄丹 硃砂米两 研天漿子 为 乾全蝎 料門枚 、龍腦細末半錢再同研与用軟 巷丘 微炒射香一载 出去売為末 服粉研養青

たこう戸 絾 圓如黑豆大每服 右同匀細用 服無時 龍腦雞珠砂 以院去雅滞 X.1 2.17 石腦油盞內重湯 們水天南星 各二錢 水銀 小兒衛生經微節方 子的康 白附

|剪刀股圓治小兒驚風欲發未見的証但先服| 清神利禹消驚戒搞 神效朱砂圆治小兒温狀舊風積熱 金牙四尾 荆芥薄荷湯化下無時 右同為細末研与養囊內和如小豆大每服二圆前 消退用之常驗 朱砂研細膩粉谷 白附子也 石ーー 分半 夏湯洗七 卷丘 連六金箔片乾蝎 分白殭糕品炒去 切壅滞能化 全十者か 圓 佃 脉 分丝

治風癎方 一次定四年全書 **蜷眼散治小兒風癎發搖** 湯以剪刀股研化服之三歲下者只半圓無時 右順手研令極細糊圓櫻桃大每服一 題點直者去 黄足 色火 别 半 錢研 少用嘴 小兒衛生總微論方 全者龍腦 圓金銀游尚

麻黄蝎稍散治如前 右將二 石 麻黄土根節 期稍 同拌匀為散每服 為已 加減與服無時 未光川芒硝 蜷娘 少天麻 內防葵 科明 用海荷 級及葉乾透取出為末每服半錢金 卷五 天竺黄味 箇 + 字或半錢乳香湯調 一葉聚過外更用紙果了 四 问 研分細二 14米两 下旱里

大足四事在 葱湯圓治風癎發搖疾威壅熱 **芎犀散治風癇多因不省** 右為細末每服半錢温酒調下無時 銀涛荷湯調下無時 麻西各半 川芎 未一分朱砂半錢匯塩以去然 天南星地見為未喝稍似炒半夏九七次寒水石 犀角屑 小兒衛生總微繭方 獨活其商 妈稍 ¥

人参化風青治風痼發指涕飲無時 量大小與之無時 圆量大小加減無時 右為細末煉塞圓如皂子大每服一 右為細末麺糊圓菜豆大燒葱白泡湯送 白附子的半尾活其獨活盡防風去蘆并天麻酒浸全蝎似炒个殭蠶去然啃人参走 風癎 巷五 九三丁戶 八三百 皂荚煎圆治如前 雞蘇散治小兒風癎 右各等分為細末以茶清調下半錢或一字無時 以家和圓如小豆大服之亦可無時 以鼈甲去裙欄炙黃杵末每服 肥嫩不 如皂角 千年 雞蘇 木賊 以炭火城至炭退吹· 炭火城至炭退吹· 荆芥 小兒衛生總微論方 去其灰內簇熟無味將計奏成膏別頓一號去收發以水二大碗按計院 錢乳汁調服

榴梅散治如前 銀月四星 灌之兒稍大用防風汤調下 研為散好服半錢乳調下搖者服之便定不會服者 大每服五七圓温湯送下乳食前 右研就丹為細末量其所用入皂英膏和劑圓菜豆 以大石榴一 加大火煅通赤良久去火放冷去泥取其中焦者 以頂盖之紙的拉黃泥封表了先用微火矣乾漸 4 枚割頂去子別作甕入全蝎五个在內 無時

牛黄膏 欠足り事亡皆 八青膏治風痼發搖 開 紀半皂子大一歲紀一皂子同牛黃膏温蓮 右為細末和匀生審劑膏每用月中兒梗米大百日 黄红 青黛什多射香川好天麻水 尾去毒失砂半錢研鳥蛇肉酒浸一宿去骨天生 一處服之五歲上者同甘露散一處服之 小犯衛生總微試方 白附子 **致未** 半生 ħ

時 右同為細末每服 石為細末研勻家和劑温 分、 碓 钱碌砂末 露散玉 中有姆做 |醋棗 大而 **孟黄至醋** 現用獨藍 者带 熟龍 照字寒水 是石膏有墙壁 **海荷水化如前法服之血** 盡盡為 度甘草 調下食後 九石 草 地线末三 教 者白 是者甘草 甜 -- <u>'</u>}

鎮心膏治驚痼發搖熱感問亂 **欠足四事全動** 右同句細每用半錢煎剃火 婚癇方 札牛黄川 遠去世草水及防巴两次 細散板板 殺土 份天竺黄 人参半两黄芩か花 小兒衛生總微論方 一两雄黄 "錢壮礪粉 小兆分 研 金箔 分升麻 服無時 两蘆 上名 片

金りゃ 金銀丹治驚癎發搖安神定志解煩熱化疾涎 右拌匀煉塞和膏每服一皂子薄荷湯化下無時 右為細未麺糊和圓作二三等圓子隨大小量圓數 黄 銀箔細 砂点半 老活其人参其茯苓 雄肯小照姆段土 題點然常錢粉內 射香纸 别火研煅 部产七蜈蚣三分腦子錢乳香分全蝎 片龍路一般 卷丘 川芎 山藥 南星 朱 蛇

欠足四年 产 鎮舊圓治舊癎發搖中焦壅熱痰威 安神湯治驚癇搖搦精神傷動心意不寧 服無時 五分去滓放温時時與服 右為細末每服一錢水一盞去心麥門冬少 挨神去成及人参去防葵 鐵粉研朱砂研水呢 去心一两石膏研 甘草分犀角末 白茯苓四白鮮皮四昌蒲 節者九人 小兒衛生經微論方 参去蓝志

治食調方并金用紫圓 真珠圓治食網發搖 右為細末煉塞和圓小雞頭大好服半圓或 荷湯化服量大小加減無時 滑石末 題末致南星秋 照研各金銀箔 4 雄黄砌水犀角扇 錢輕粉錢乾蝎人巴豆 膜出 干片 卷丘 射香 中方 龍齒 研大黄素各牛黄研 油介 盡去 祖以||用皮| 圓薄 龍

大足り事主旨 一班那散治食痼發搞身熟眼上訴 大青圓治食癎發搖及有聲 乳食前 右同研細每用一字薄荷湯調下量大小虚臭加減 葱湯下乳食前 右為未孫餅和圓菜豆大 云不出油研去皮膜出油 乾蝎 白附子 天教子三个射香字 小兒街生鄉微詞方 朱砂各一钱底粉與巴豆二十 積許宣 一歲下者 一圓上者二 圓

銀湯圓治如前 驚發搖服之立效乳食前 右為末用鶩梨汁煎菜豆粉作糊和圓豌豆大每服 圆酒一匙水一匙薄荷汁少許同化下食瘤或急 青黛抄五蜈蚣一對全好人者微炒巴豆个去 天南星酯表透 盡膜 盖雄黄末抄 用出 一钱七棘問子十 妈稍什四朱砂木红 売か巴豆か 去四

次七四年 全書 妙聖丹治食癎發搖利胸鬲 乳食前 圓煎金銀湯下乳前食更量大小加減 右為細末滴水和圓黍米大每服三五圓沉香湯下 石為細末前 明我巴豆此长出盖油上先為未職粉研外朱砂水两研射香别研陷了一分炮已賦粉件分朱砂米两研射香料鐵腦子時人做吃成於什么一分牙硝分大黄 一行湯調麵作糊圓如黍米大每服 小兒衛生網微騎方 1

蟾酥丹治食癎毒 靈朱圓治食痼乳食不消心腹壅滞四肢抽掣 湯放温送下量大小加減乳食前 右拌研匀細糯米飯和圆黍米 蟾酥 五靈胎去砂米砂研水源巴豆西飲果去油 分巴豆心出油盖杏仁皮光細研 射香 研細如粉燒粟米飯和圓黃米大 分真珠末分甘遂火 **秘
湯
樂
不
下** 卷五 根黄牡蠣粉分犀角 **天每服三圓煎荆芥** 二歲兒 研 分 温

火足四年 公馬 三癎丹治癎証發未能分辨皆可治之 錢各研細與聚藥末拌勻囊內和圓黍米大每服三 食前 右為細末石腦油半盏研極細入射香一錢腦子半 水下二圓取或利或吐效更在量大小加減服之 枝半两火 黑錫一两水銀半两二味喝稍半木香料天南星 炮半 列 題 教 內 炒 黄 T 小兒衛生總微論方 半人参丰萬半夏半两湯防風

治心病羊癎 治五蔵五畜癎方 叉方 治肝病大痼 金りでたける 伏日取犬齒水磨汁服 取犬頷骨為末服 五九至十九煎荆芥蓮 三月三日取羊齒水磨汁

一次足四事全書 又方 治脾病牛癎 叉方 又云心病馬癇 取白牛屎中豆服之 取馬毛燒灰為末水服一云馬蹄 取牛齒水磨服怎牛齒最佳 取馬齒水磨汁服 1 小兒衛生約微論方 1

治肾病猪癎 治肺病雞癎 叉方 取白雞腦水調服 取牛鼻中木焼灰服 焼蹄末服 五月五日取猪齒上 起五

五色圆治五蔵五種癇並主 取猪乳服 右為末煉塞和圓麻子大每服三四圓煎金母 金水銀熬 朱砂水飛 水銀分雄黄水飛 研 八七行上憩处每万 播口吐涎沫 研一極两 細令

治偏擔方 |欽定四庫全書 (創金治驚 相偏搖 右同為細末每用半錢射香湯調下無時 右縣至乾以利刀當脊分切作两畔各逐左右別 那路峰 亦足蜈蚣年紫色大蝗娘 半 飛分 研 房海的就石昌浦節者良桂心丹遠志北東日 参去蓝牛黄一分古仁涉沒麸炒去朱

雙金散治如前 黃置枯子面南用快竹刀子當脊縫中停利作两半 右遇其患者每用一字許真內任指之左治左右治 為細末不得交錯各用貼子威之於貼子上 用两貼子號記左右字不得交差差則誤矣 右以蜈蚣一条大者去頭足尾用真酥塗慢火上 右俱摇者任右則右住任左則左住左右任旨住 錢亦分左右两處先將左分一半在左字貼 小兄都生犯数編方 t 一號記左

一致定四年全書 保壽散治驚癎偏搖 餘同上法二方相犯 中随指者左右異孔中吹之用樂不可多若眼中 睛搐搦不省不能出聲者用細等筒子置樂少許在 字貼內感記不得相犯每遇病者眼睛用上止見白 内與蜈蚣同研作細末却入左字貼內威此次将右 未下即添些小以意度量其眼随手便下搐亦便 入在右邊貼內與蜈蚣同研作細末却入右

治陽搖急驚方 とこヨ 巨八島 右細匀每用半錢熟水調下一歲用一字無時 右拌匀入腦射各 乾蝎科四州五个 天南星与两生朱砂米两研水银 錢再研聚內和劑入石切中 小兒衛生鄉微論方 一一一 朱砂畔两牙硝 半分月真 ナ 細胞

朱粉丹及名鶴治急醬出熟吐涎發搐 金月四月 白雪 |靈圓治急驚化涎定搐 驗無時 右為細末糊圓黍米大每服三两圓煎桃仁湯下 方無巴豆但作散每服半錢湯使如前無時 三五百下圓如皂子大每服 用一五方 个只 朱砂半两研戲粉小喝稍半两巴豆性出去 巷五 圓煎 盡心用皮

更足四事全書 大漿子圓治急驚發搐 小加減服無時 右為末匀細糯米飯和圓黍米大温酒下三圓量上 乾蝎 烈犀角末分半夏汁 研 天漿子出者去克牛黄別研射香 炒天麻分蟬般分級炒射香一致牛 小兒衛生總微調方 七次蟾酥 钱猪膽 地烈白 附子 研我白附子 九

右為細末二歲上兒半銭七已下者一字金銀薄荷 砂散治如前 右為細末入猪膽汁和劑如汁少入少麵糊圓黍 湯調下三歲上者 大每服三五圓薄荷湯下無時 松气多甘草气钱 朱砂小我研膩粉與射香研發圖會二錢奶黃連 錢姆稍止白附子錢金箔片殭蠶并分妹亦足誤 一錢七如口噤不開灌入臭中 <u>5</u>

白金散治如前 七寳牛黄圓治急驚目睛上視手足發搐 時 細末入硃砂末乙銭拌匀毎用半銭煎金銀薄荷湯 放温調下無時 右為麄末用水五盞慢火一處煮水盡為度焙乾為 朱砂水粉霜别輕粉 天南星四破之 朴硝十五 雄黄研水飛牛黄料發 平两白替钱甘草科

|欽定四庫全書 水銀圓治急騰痰壅發播問亂口味 時 日分三服者兒大小壯怯及病勢輕重以意加減 右為細末糯米粥和圓小豆大二歲下兒半圓上者 圓金銀薄荷湯磨化服之月內兒一圓分四服百 中等射香一 至里畫脈粉 字 川外神生华後語法 多南星 一地烈乾姆、 Ŧ 無

湯下三歲加一圓五歲者三圓如有驚在內者利動 右為細末麺糊和圓蒙豆大二歲兒一 右為末再用豪內和圓黍米大每服五七圓乳香湯 至病盡樂圓乃出如無驚者樂不下也甚妙而稳乳 朱砂圓治急驚發播疾壅 **下量大小加減無時** 大錢杏仁湯 朱砂水飛 巴豆膜出油令盡 半夏焙乾為末次 浸去皮 尖妙哉 圓荆芥薄荷

欽定四庫全書 至聖青治急驚發播手拳緊多脏啼叶煩熱馬宴 食前 涎多加輕粉半 右為細末煉蜜和圓蒙豆大薄荷温湯化下 黄散治急驚搐搦壯熱馬壅疾感 朱砂小彩天南星 十九个胜射各 - 錢更量大小加減無時 1) 身帶生然帶 苦方 步 研輵稍 圓 凹

欠とり手と馬 #那散治急驚風潮搐 播得此方治安渠恐再發遂與常服之 錢濃煎防風湯調下子相識王宣教 以全蝎中中緊寬者去尾尖上毒炒焦為末每服 石為細末 **馮或得睡汗皆愈如牙關噤即先用藥** 在供方 **煮用** 過皂 炒爽 至半 腦射各少許每用 乾鋌 州朱砂 小兒衛生總微論方 水一飛銭 字 理講 ~妙選 Ŧ 病驚 與鳥

治急驚風搖疾感 四聖散治一歲至五六歲兒急驚潮搖 治小兒卒得急癎 金がでる 右同研膏每服少許薄荷温水化下無時 蛇散服之尤佳 右剉碎以水五合煮取二合分八服日五夜三 鉤藤 天漿子二放朱砂冊水飛全蝎人射香三小 甘草矣

治急驚發癎迷問不省嚼舌仰目爽搐 次足口事主些 又方治如前 服無時 以全蝎 計時更量大小加減 右同為末軟飯和圓栗米 研細末分作四服温湯調下亦治大人風涎只作 枚薄荷四葉聚合火上炙令薄荷葉焦同 1 小兒衛生總微論方 生林朱砂 大每服二 圓荆芥湯

涎即愈 以犀角末半錢錢温水二合分服 以多為佳 以真牛黄 **炙乾研末猪乳三合和之綿纏蘸浸與兒吮之頻頻** 以虎睛研末以水調灌之量大小與一方用一 以真熊膽二大豆許以乳汁或竹瀝服之能去心中 驚似有痛處而不知疾狀 一大豆許研細和家水服之 一豆許

食 視咬牙服之退驚化涎凉馬鎮心祛邪止嗽美進乳 黃膏治驚風邪熱痰威馬壅時發潮搖 右為細末量大小用藥以水六分煎 蝎 黄研别 矣焦府黄去節 薄荷吳焦 雄雞冠血滴少許入兒口中 -**搐壯熱痰壅嘔吐不止** 一錢 甘草钱二 見對主兜数論方 牙硝枯朱砂研水 呷温服 古

治族童天吊癇搖 天形附 |銀定匹庫全書 為衣每服一 生圓治天吊搖 以東行桑根取汁與服 右為細末煉塞和劑每九錢重分作 蝎 致雄黄 大雅中 天南星地烈巴豆比战去 圓温薄荷水化下乳後 獨壯熟蔵府壅滞 蛤粉三錢金箔片銀箔 7糖口瘡 十圆以金箔 許少

治天吊倫急塗頂法 r 圆黍米 右於清明時初夜將樂露比極 **禾以政四十九粒口含不語津潤至脱去皮研爛** <u>į</u> 散治天吊眼上 大隨年圓數温水 生芸薹子辣生 水調塗貼頂上立驗 能退風爽神 小兒衛生總微論方 乳食前 宿明旦杵羅 至五

好完正庫全書 靈色青治天甲目睛上脈手足唇口指掣 乾燥為度取出再研極細每服一 右以壁魚兒乾者十个濕者五个用乳汁相和研爛 再入乳汁少許灌之 留般將諸樂入在內塩泥封褁於竈內慢火燒至泥 珀散治天吊覧風發搐 石為細末次入蕎麥麺一分用酸石榴 大天南星地烈 微乾蝎 分題を見かが蝉 一字温酒調下無時

治陰播慢驚方 **運難散治天甲目上視發搖** 欠足四年合 右為末每服 右拌匀每服 半 白殭龍去然嘴馬牙硝两蔚金两乾蝎 两 字前金銀薄荷湯調 乳汁調下急者服半 小兒衛生總微論方 一無時 テナ

銀白散治吐鴻生風發慢驚瘈瘲此樂收延醒脾去風 置新五十 右為細末每服半錢水一盞入金銀薄荷前至七分 用凳器合之 温服連進三服無時 右用大天南星 リバノニ 犀角屑红白木 匀每半 一周圍以炭火炙令乾烈頓於地 /候冷取出杵羅為末次入朱砂細末 个重一两者換酒浸七伏時取出 水黄甘草半两獨皮 湯調下早辰午前各 去半白两 **分**

融幣圓治慢幣身熱與飛昏情 青金膏治因吐源 **欠足习事产品** 薄荷湯化下量大小與服無時 右為細末入研藥拌匀煉蜜和膏圓皂子上 朱砂木一錢香墨木 **膨料线使君子** 府門青金 宿 焙乾姆稍分天麻分白附子分大附 小兒衛生總微論方 分射香研我天竺黄研 《我 盖 會 就 丁七 ઇ

羗活骨治脾胃虚而生風或因吐利或取轉過度發為 金げで近 ノヨド 圍無時 慢驚 右拌匀細寒食麺作糊和圓桐子 石為末同与每服一字薄荷湯調下無時 散治慢驚身冷寒飛昏用尿生名 我白附子一钱朱砂二钱 研射香 大附子者生用去皮臍天南星 工生,用半 垂錢 研 上次用

右為細末同匀煉蜜和臍旋圓如大豆許每服 薄荷湯或去心麥門冬湯下一 天麻の殭盤は 也木香錢二 研 節肉豆冠機養者華土沉香 黄州水辰 乾酒 择一分防風去蓋并 炒黄 が藍白附子 钱水 半飛 各 乾蝎 一二圓量大小加減 粉研字腦子 炒附了 雞舌香 两皮 圓 丁毋 各

動定四庫全書 温白圆治脾困瘦弱或因吐泻或久病成慢驚身冷爽 瘲 急驚者勿服此樂性温故也服之無時 用每服五七圓至一二十圓量大小加減生姜米 右為細末以湯調下食麺作糊圓業豆大圓了頓寒 食麺中養七日畢取而用之若急用未足日數亦可 星岩游 天麻丹殭蠶嘴一分白附子生 分次 川男特当然指言プ 去毒天南

药藤飲子治陰癎多昏睡手足冷時換凝直視不乳 審是陰癎的當用藥末二錢入炮過附子碎用指面 量大小與服小者分三四次與服不會服即灌之 許依前煎之温服日三夜一急驚不用附子服之 右為末每用二錢水一盞生姜五片煎至七分去津 下空心服看病勢漸加圓數多與服炒 炙翅 鉤藤鉤子ヶ殭饕睛炒川芎 **把蛇冬一分蛙螂翅足炙** 小巴科上到沒病方 黄頭 甘草《蟬殼并頭 干九

一欽定四庫全書 七里圓治陰痼體虚羸瘦多困 天漿子散治陰痼昏因多睡時時爽痰 時 薄荷水化開灌兒員中如得嚏則可醫以金銀湯化 右為細末煉蜜圓桐子大如遇病者先以半圓湯泡 烏蛇 附子各一 蝇即五个去頭 一圓日二三若灌藥不噎難治服之無時 骨月段取 **!** 內用蝎梢 卷五 翅蟾酥二鬼 白殭蚕然喘青黛 白

火足四年入野 七神丹治陰癎面青口噤喉內涎吼手足療癡指弱 右為細末每服 右為細末以熟囊內和圓葉豆大薄荷湯下二三 **夗小化服亦得無時** 汗出為效服之無時 朱砂州水牛黄研羗活去蘆谷天南星地到射香 天漿子是用出白殭點 我蝎尾 炒殭糕去然嘴炒 一字煎去根節麻黄湯調下日三 小兒衛生總微高方 炒乾全蝎 炒イ 丰 一得 圓

五靈脂圓治如前 大南星煎圓治陰癎慢驚與飛 成兒三圓薄荷湯送下日二服 無時 右下三味為細末入膏和圆菜豆大三歲兒二圓五 五靈脂品砂白附子 麻一乾蝎一 天南星一两細對水二益慢火熬 ,生天南星生乾蝎生蟬殼 白附子炒烈天

必救丹治如前 **規裁青治如前** 火足以事上上 右以螻蛄一个去頭規足入射香軽粉各黄米許同 樂和圓菜豆大未滿月兒以乳汁化下 出是效無時 研極細以新水少許就之用規殼灌之立效 右為細末用醋二盞先以藥末一 一圓大者以意加之金銀薄荷湯化下服畢臭上 小兒衛生鄉微論方 两同热成膏入餘 圓二歲 Ŧ

大金散 散下無時 右為細末分作九服如遇患者將一服分二處每 半用童子小便并酒共半盞前三四沸放冷調藥 右為細末煎猪脂油九黍米大每服三五圓用大金 赤足蜈蚣 辰砂水號直鐵粉錢輕粉錢金箔片大 砂米钱 研打香 及去妈稍忙生犀光錯末涂坯铁朱 字

火足四事上 董陸香圓治虚風慢驚發搖瘈癡安神蒐定心氣 驚疾惡積便安如已經取轉虚者即用井花水調大 氣雖絕心頭温者灌下藥即醒 校大每服 半送下必救丹如行五里許再一 右研細於火上炙鎔為圓如乾即入少水和如酸棗 金散下必救丹須認是慢驚者方可與服立見其効 **血竭糾研乳香别研** 一圓薄荷酒化下無治婦人産後血暈 小兒衛生總機論方 服約半日後便

蜈蚣一條全者蝎十四个全辰砂一钱如神散治如前焦大官 多りロス 省人事無時 無時 右為細末百日紀一字荆芥湯調下漸大以意加之 雄青治如前 附子切钱朱砂米 赤頭蜈蚣一条日縣 1:11 整五 雅研細辛 去 截軽粉發松門美令脱天旗服存地 段推好的

| 決定四車全書 蓮顋法治陰癎慢紫 妙聖散治慢驚久不差兩手瘈瘲抽掣不定 塗顋頂上 湯化下一圓無時 右為細末入腦射各少許煉塞和圓雞頭子上 右以天南星洗十過為細末用生姜自然汁煮糊調 飛白术片 赤足蜈蚣 N. 我蔚金钱半夏 日焙乾 草鳥頭尖去自然汁浸条葱汁浸草鳥頭尖十四个薄荷 小兒衛生總微訪方 宿又洗切焙乾钱洗净生姜汁 浸

天麻釣藤湯治因吐利脾胃虚而生風變慢驚 右同為細末每用二錢水一盞煎至六分量大小 手定時方可無服別藥 右拌匀每用半字以小華筒吹入兜两鼻孔中候两 射香 節 題數好黃 蝎尾去毒炒甘草家 鉤藤が天麻 同為末 射香 67 钱 蟬 於去防風 去 蘆并人 研 我能照升我 考覧か

喝起散治因吐源生風變慢驚或作慢脾風 とこり見 生銀散治慢驚乍静作動手足瘈瘲時發時止 服無時 右為末每服一 服如冷多面青唇白四肢冷入附子 飛滑石 生銀末鄉城蛇黄年少城酷黑鉛 X.1 2.1) 七次為未生美理作餅如稀入少麺一一两湯洗生美四两研取汁和半夏末 白幣性谷沒石子仁 字前冬瓜湯調下如 小兒街生總微論方 服醒便止後 彭 朱砂

|藥太過可用解毒樂治之無不効者 之家所患幾日因何得之曾服何藥如此詳審若服 治陰痼者多用性温熱之樂有至癇証已退未退之間 多片四届 台書 豆卷散治陰輔慢騰服温樂太多而却 却生熟証或及為怠驚者甚多如治病必當先問病者 用薄荷乳计調下汗出為效 右為紅末每服一 鋖 字前犀角屑湯調下如見沉困者 醋錢華粉纸朱砂小戲射香魚 |熟証反為急

龍腦散治如前 てハフラ 用藥三錢漿水入油敷滴煎之又治吐蟲無時 右同為細末每服半錢或 欍 一炙 两各 大豆卷黃水浸黑豆生并實聚 大黃遇半夏涉沒一日焙 銀星石 寒水石 小兒衛生總数論方 一錢白水煎放冷服甚者 乾炒用甘草炙金星石 产业次不一大 般醋不 板藍根 甘草

慢胖風附 銀白散治慢脾驚風危困者 到分四年全書 錢量大小加減此舊方也錢乙入甘松两枝霍香末 天南星末生姜自然汁和劑捻作餅子 右等分為未入龍腦一字再研新水調下一字或半 股青白粉即青 四月全書 銭金牙石一分却減大黄一半 服之無時 和剩捻作餅子炙乾 起丘 炙黄白附子

飲定四車全書 **羗活膏治慢驚嘔吐及脾風及身體冷四肢硬危急將** 不救者 樂末拌勻煉蜜和青圓皂子大薄荷湯化下保生 右先研硫黄次入射香水銀研至無星極細叉入諸 右同為細末每服半錢或 **羗活盖獨活并益** 後射香研 一致 草蝎是妙研水银钱硫黄银同研收先為乾蝎一致酒水银华硫黄半钱與蘆獨活井土人参蓋茯苓皮防風之枝并 T. 字 小兒衛生鄉微論方 錢煎冬瓜子湯調下 テナ 研與 治 如水

或作胂風危急之候 大天南星散治吐濕或服轉藥過度脾虚生風為慢驚 內然後入天南星却用炭火三两條盖却坑子候天南 胃虚吐寫生風羗活天麻防風各半两人参茯苓蝎 深三寸許用炭火五斤燒通赤去火入好酒半盏在 右以天南星一枚重八九錢至 星微烈取出剉碎再炒令匀熟不可稍生放冷為細 分朱砂水銀硫黄各一 一分服之無時 两者先撅一地坑

|改定四車全書 辰砂膏治陰癇擋掣昏因傳為脾風 又方治如前 右以大附子一枚重六七錢上微炮去皮臍於頂頭 如至百刻水未盡加少火熬乾去厚朴只用半夏為 右用米泔三升同浸 **緬末每服半字或一字薄荷湯化下無時** 末每服 梓州厚朴去粗皮生姜半夏一錢湯洗七次生 Ą 小兒衛生經微論方 百刻周一伏将以水盡為度 防風湯調下無時 姜

満於火上燒存性次用天南星炒級蝎稍分羗活 九射香薄荷湯入酒三两滴化服無時 紅朱砂畔两月為細末煉蜜和圓雞頭子大每服 散西日作翅 天南星 大附子 竅子入粉霜 砌砂各半錢却用取下附子末填 者炮烈去 烏蛇肉酒浸去 骨天麻 皮两 **醉全蝎半我白附子三我** 麻黄去根節 白

しとヨ 病則抽對脾主因病則昏困腎主寒病則身冷故病 受其病心主血病則血亂肺主氣病則氣并肝主筋 **錢或一錢温水調下若已發慢驚者此五蔵俱虚皆** 者血亂氣并四支抽製吐寫昏困唇口色白身體冰 **欲發慢驚者以麹一两為末入腦子末一字每服半** 日可用遇小兒吐鴻精神昏困多睡不乳四支逆冷 和与踏作題楮葉卷七日取出以紙袋感中起十四 右為末以水 Þ 产上 1 升浸三日源去其澤用寒食麵一袋 小兒衛生經微論方

多りに元 問孝忠云小兒吐鴻脾胃虚而生風以為慢**驚或傳成** 家蔵服之無時 煉蜜圓雞頭大名太乙丹治小兒百病此方陳易簡 雞頭大名两丁膏温水化下又別以趣末一两朱砂 **胖風者用題末一两朱砂末一錢半拌匀煉蜜和丸** 末雄黃末各抄一錢琥珀末廿草末各抄二錢拌句 冷神情松悸面青喉響哭如鴉聲將上件已成樂更 人朱砂末一錢半拌勺服依上法若慢驚吐利傳 ノジュード 淡定四車全書 至二三两無害候胃氣生手足漸煖隆退四支猶然疾 九并研金液丹作末煎生姜米飲調灌之多服乃効服 脾風大便不聚至虛損危憊者當速生胃氣宜與理中 生十有七八子於岳太尉處得一 類方並依此治之 **飛即减金液丹一** 與服以意詳之漸減金液丹加白圓子無用 方中耳 M 二分却用青州白圓子一二分同研 仍順與粥食雖至危始往往死中 海門差活青温白圓鉤縣飲子 小兒衛生總機 論方 方稱自王運使 下九

與上 治小兒急慢驚風吐鴻不止危不可治者名為安胃圓 射香牛黃九治小兒急慢驚風慢脾風 右同研為細末以糯米飯和九黍米大每服三二 ,煎蘿蔔糯米湯下無時 一相似大同而小異 香許少 好青州白圓子粒十好金液丹粒十全蝎 一致射香 我妈村上 上我乳香 去刺射

射香餅子治小兒吐酒之後脾虛生風目睛斜 **欠足日年产上与** 効無時 圆研細煎金銀薄荷湯調下七歲至十歲服二九至 三九煎人参汤調下慢驚風細研三九灌下大有神 右為細末酒糊劑如皂子大一歲至三歲兒每服 朱砂 **| 裁半天麻** 娱监 **酥条花蛇肉** 釤 小兒街生經微論方 半 防風枝 崮 宿錢 天 銭升 4 視肯 研

强硬手 右為末同勻細酒糊圓如雞頭大捏作餅子每服 りにん 舒煎人参薄荷湯化下 散治慢脾風 川烏麻一か天南星如 蝎稍 外乳香料分錢 足與飛乃治心肺中風昏塞不省 分蜈蚣 里豆 か半から 合甘草学 末足 华黄州分 白花蛇酒 取浸相此 飛 分 内 一 犯 方 一 好 后 而 與 乾去小前 用皮異方

急慢騰通用治小兒急慢騰風聲已 火足口戶户門 天麻膏治小兒急慢驚風及慢脾 傳王 右為細末每服半 者男在女右屈中指在手心横然當中點炷及 妙運 同時下矣壮如麥粒甚者不過三肚聲回即止 全蝎 切惡候及止寫等疾 小兒衛生總機論方 白附子왨天麻纸 無時)不出危殆命在 P 炙此 與 頒 研

牛黄九治急慢驚發歇不止 輕重用藥則無失矣 湯化下並不拘時候更量大小臨時加減亦看病之 石為細末煉家九如雞頭大每服一 - 甚者两丸泄瀉者煎冬瓜子湯下嘔吐者煎丁 訶子 -我白殭糕去然嘴 黄研天竺黄研犀角屑 钱白木 乾藿香葉 此致白蓝冠仁 £.)谷半芎虧 為荷湯 一段縮砂

黑神圓治急慢驚 右為末糊圓桐子大每服半圓薄荷水下 石為細末煉蜜和蒙豆大每服三九粥飲下 ī 圓娃儿 腻粉半 使君子 į 報腦子 多<u>基</u>左 我香墨我白麵我盧會钱牛 熟用各半錢照子字射香字去先題裏煨照子一射香一 小醫王鑑因此樂致富甚保惜之未嘗 半 戗 小兒衛生與微鍋方 丁香 鉤藤 黄明青黛 罕二 無時

一致灾四年全書 青金丹治如前 差無時 右為末以梨汁和劑分三等圓之黍米麻子第豆大 、予得之乃睡驚九 炒 雄黄锐朱砂末钺鐵粉錢乳香末致南星末 圆海荷水送下前金银湯亦得 青黛线"射香子花頭蛇 小異耳治院極效垂死 **宿**箇洞 取浸 蝎 方

雄朱丹治如前 ケノス・ラ・ユ 蟮却須放了不可壞死服之無時 子刮下九如芥子大每服三九金銀薄荷湯下 右為細末用白項曲蟮 摇目睛上 金丹又名聖力丹治小兒急慢驚風三癇 雄黄水朱砂水飛 · 1.5 視或牵斜 無時 小兒衛生總微論方 偏擒背脊强直或反折如弓口 条放藥中 7 - 其曲 珥

噤牙緊或屈指如數或温壯連鄉或服凉樂過多內生 動员四周全量 但只服此藥即便放下眼來如小兒涎熱風熱有諸驚 水銀圓化此藥服之二藥引化驚涎則湖搖立止虛者 証乳食不進昏胃不省凡此急候服之皆愈但不喘急 **虚風或因傷寒變搐發渴或因吐痢生風為癎** 服之便差更無變動又治大人卒中風病涎潮 此樂必勢如已 喘急者更須審詳虚宴若延宴者同 神聖教人 諸

てこうう 枚ニ 蝇去似 用中 須者 錢射香研 二炮 錢烈 各 蛇 一取 分肉 研别 赤二足条 各 线蟾 蛇蛇 肉豈榖 一钱龍" 佳生 浸二 飛研 全蝎 小兒衛生總微論方 煨麺 宿取 大金箔 去项 皮後 准三 附 骨盆 爆處 銀 焙湯 乾肉 結用 箔 不各的黑 南 五各 者炮 星 置 片 用烈 之去 杏 火两 用 Ξ 麻 半錢 到炮 酒 皮 使 白 附 娯

一到厅四年全皇 圓化下小兒量大小與大有神驗水銀圓具譚氏方 筘為衣每服一圓金銀簿 荷湯化下涎寔者用水銀 右為未逐件旋入研之細匀用不蚛皂莢 內和諸樂得所大者圓橐大小者皂子大別以金銀 皮紋以好酒半升浸一 也服之無時 一錢銀器內文武火煎十數沸放冷別煉蜜少許投 大青金丹治山 · 兒諸驚此東京西瓦內出發馬 巷五 一宿按揉取计去滓入石腦油 一鋌刮去

ととりる 服 右於銚內先鎔錫化入水銀結砂子乳鉢內研開次 盆內鋪紙於紙上布藥浥乾十歲兒一 (諸樂末研与細方用濃墨水和九彈子大以灰頓 雅 水銀 科錫 科 天竺黄む 八咸紀作四服五六歳兒分六服三四歳兒分 二歳紀分十六服新生百時紀分三十服並微 广墨二錠不計大 小兒衛生總微論方 小射香研 一粒か三四服 我我砂 艺

治急慢驚發搐 動片四月全十 治方如前 **威嗽喘並臨時加減如吐冩後生風服亦不妨此樂** 右同研細每服半錢乳香 性温宜少服並用湯化下如煎湯不可 如聖服之無時 利常服者須隔旬日服 乳香料两甘遂到 卷五 服小兒風熱發癎朝搖涎 調下炒 犯鐵器

定命丹治急慢驚風吊眼撮口搐搦不定壯熟因重 酒調下無時 右同為末每服 右勻細末栗米粥和九箓豆大別以青黛為衣每服] 青黛料钱研射香沙 蟾酥一錢乾者乾蝎之松南星末分白附子 薄荷湯下服藥後因脏無疑几病者先化 小兒衛生鄉微論方 自射香兰歌 - 錢用赤小豆拌勻薄荷温 聖士

銀完四年全書 油 人無諸驚 邪熱服之無時 烏頭蛇 去光射香钱 炮 九點翼中得喷者必刻如新生兒用膩粉 滴新水半茶脚化 白殭蠶去然嘴乳香料两朱砂小两研天漿 一治如前 智取为 妈科两白附子 K 金箔 九服之取下胎中所受病 大捻扁作 一餅子用金銀 炮 一两天南星 捻生

「ハハリョ こもう 如聖散治如前 和九便是麥飯膏此黑孩兒柏防禦真方也 右為細末上 射許少 白附子 天竺黄、致天南星米泔浸 三錢草烏半两炮牙硝起丁香見 我 冠號城一钱全蚂 炒去足的身尾 小兒街生總微論方 、無時以便是除風膏若以麥飯 我宿 龍 盗 四土 甲麺 腦 鉞半

南星湯治如前 一到好四届全書 片冬爪子敷粒煎至半盏以下分二服尤治慢驚服 錢上下以水半盞漿水半盞或虀汁亦得入生姜三 如兒驚結大小便不通連進二三服無時 **か三服病愈以四君子湯補之一方毎用南星末** 碗冬瓜子四十九粒同煎至一盏去浑取青汁半落 右以大天南星一枚重四銭者細研為末用漿水

伙定四事全書 朱金湯治如前 南朱青治如前 盡用二膽亦得服之無時 歲半九熟水化下量大小加減如一膽威南星末不 却入膽中如膽汁少量可用之客乾為細末入朱砂 右以大天南星二两為末用臘月黃牛 右以代赭石火煅醋淬十次為細末水飛過日中縣 錢射香少許前甘草膏子和潮九雞子大每 Į. 小兒衛生總微訪方 膽取汁和之 罕

如聖青金丹治忽發身熱吐逆變急慢驚潮搖 乾每服半錢或 安也若無赤斑點者出不可治也服無時 進三服兒脚腔上有赤斑點者即是邪氣已出兒當 右細勻末滴水丸雞頭子大慢驚用冷薄荷湯化 青黛好我使君子慢火煨熟為未金箔 龍腦一致射香研脈粉研各白麵具香墨為我半 研片 **錢前,真金湯調下量大小與之連** 銀箔 五各

火足口事全書 滚涎膏治慢驚風潮搖無時 右同研自然成骨丸楊梅挾大梨汁化下一九量上 黄丸治急慢驚 龍腦字朱砂大錢鵬砂末錢馬牙硝錢鉛霜錢水 加減無時 九須更便睡睡覺立愈更服三两服急驚化 砂好給牛黄字射香字 合以來神効無時 好 搖疾壅及止寫生風 小兒衛生鄉微論方 學九

罷搖九治急慢驚發搖牙關噤身反强 九相宜加減無時 右為細末煉蜜和九雞頭寔大荆於薄荷湯化下 一分天麻去的防風去蘆上白殭養以去然於神 牛黄纸牛膽製天南星末錢滴乳香末今我 銀二钱黑鉛二钱天麻井两花蛇內酒浸炙 其 天南星 朱砂小钱研射者分全蝎分腦子少 上地两 卷五 白 附子 男去毒朱砂 两 舣

虎睛九治急慢驚擋涎熱多睡及諸惡証 湯化下無時 右為細末石腦油研和九小麻子大每服一九蓮 砂水飛全蝎半两牛黄两天南星慢火炮烈京墨附子分天漿子黄去壳炒使君子切碎焙乾朱虎睛浸一宿焙乾通明天麻两白挨神太半两白 水飛青黛 過青黛科射香 腦子 射香品少

欽定四庫全書 烏蛇散治急慢驚搐如弓危困難治療之者此方主之 右為細末每服半錢用舊斷井索煎湯調下其効如 有急病加作二三九極妙無時 右同匀細末酒糊丸桐子大每服一 神如急用無斷井索煎荆芥湯代之無時 地射香み 為蛇內習浸去皮亦足蜈蚣品及矣無 全蝎兵 天麻丹白茯苓两黑附子去皮臍白附子 11少精出然指言日

治胎癎發播真假方 **烏金膏治胎癎發搖頻併 虒晴丸治自生蓐內至百日以來壯熟驚搐几發在百** 日內者雖發播真假相似然發頻者多是外風傷之也 右為細末煉蜜和九箓豆大以乳汁研化三五九 虎睛人對酒浸微牛黃別研朱砂一分研雄黄 以水射香研 由别用酒浸一宿焙 鑑纸燒灰蝦炭半两一条水浸去皮骨只取糕纸一張與大土 か 5

欽定四庫全書 黄九治自生至百日以來五職多熱而發驚搐 荷湯化開服無時 右同研如粉栗米飯和九麻子大温水化 右拌匀煉蜜和膏丸皂子大當每服一 角末对 細三 研十 全蝎半两上朱砂件两射香件錢腦子件錢金箔 令研龍腦分黃茶末两朱砂畔兩乾蝎分犀一分龍腦一黄茶木件朱砂畔两乾蝎 1.多特兰無形言言 一粒煎人

銀朱丹治如前 **羗活膏治胎癎發搐昏困不省** 欠己可申自動 無時 下無時 右為細末煉蜜和膏每服一包子大射香荆 乾蝎心外天漿子炒去克朱砂件两牛黄八 男牛两白 **運輸去然嘴人**参去產 羌活 法 為 烏蛇肉 小兒衛生總微論方 南焙乾獨活士 <u>藤天麻</u> 至

金がられる 生摩膏治新生兒肌膚幼弱為風邪两中身體壯熱 甲灰圓治生下便喜多驚 湯化下兒小乳汁化下亦得無時 右剪父母两手爪甲燒灰研細麺糊和丸麻子大井 右同拌匀麺糊和九黍米大每服三五丸金銀簿 花水化下一丸無時 足驚對 蜂房為細未炒水銀 分結砂子射香鉄

朱砂散治 欠己日事 白馬 視稠濁得两膏成乃去滓丸如彈子大每服 手摩兒百獨寒者更熱熱者更寒小兒無病早起常 以摩顋上及手足心甚辟風寒之邪 右吹咀以猪肪脂一 十去 鉄蘆 甘草 臘至月內兒發驚轉為慢驚 飛研牛黄川 防風去蘆并又白术红 一斤煎油入藥微火上煎之良久 小兒衛生總微論方 研射看錢乾蝎十四个 十雷元二致桔梗 4 一粒炙

至生下百日之內心神不寧睡的不醒壯執躁煩啼哭 保生散治新生兒胎驚此在母胎中時因有所驚 無時面青亦腰直身冷搖縮口提或進青黃水 口中以乳汁送下無時 右各研細 黄去壳 取虫用 水煮鹏砂研鐵粉 一處再研極細散每服半錢乳汁調抹兒 ?乳计調下服藥後有青赤物

琥珀丸 治嬰小初生未滿月驚著似中風欲死者此方主之 此樂眼反牙噤如魚口者乃死候也服之無時 石為未酒糊和九黍米大薄荷温湯下 以好朱砂用新汲水磨濃计塗五心上神驗 **乾全蝎火琥珀** 是効如無隔日服琥珀丸服之無時 三錢龍魁井錢 , 研鐵粉炒路輕粉 , 小兒衛生鄉微論方 南星炮白附 五

| 欽定匹庫全書 治嬰小新生中風 以射香一 射香同研如粉每服一字乳汁調下日三服 把以乳计和令得所於銅器中慢大炒令焦燥與 一分鹽前背交脊上會中毛板取手指大 總微論方卷五 N. 卷五